



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Держпродспоживслужба

STATE SERVICE OF UKRAINE
ON FOOD SAFETY
AND CONSUMERS PROTECTION
SSUFSCP

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

**MAIN ADMINISTRATION
OF SSUFSCP
IN VOLYN REGION**

вул. Поліська Січ, 10, м. Луцьк, 43027,
тел. (0332) 280-691
E-mail: post@voldpss.gov.ua,
сайт: www.voldpss.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 40317441

10, Poliska Sich str., Lutsk, 43027,
phone: (0332) 280-691
E-mail: post@voldpss.gov.ua,
WEB: www.voldpss.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 40317441

№ _____ від _____ 20 __ р.

на № _____ від _____ 20 __ р.

Суб'єктам господарювання

ТЕРМІНОВЕ (СИГНАЛІЗАЦІЙНЕ) ПОВІДОМЛЕННЯ

Звертаємо вашу увагу, що підвищення температури повітря сприяє виходу із місць зимівлі шкідників сільськогосподарських культур. Під час проведення фітосанітарного моніторингу посівів озимого ріпаку в Луцькому та Володимирському районах спостерігається вихід жуків великого ріпакового та капустяного стеблового прихованохоботників. Шкоди посівам завдають як дорослі жуки, так і личинки.

Зимують жуки прихованохоботників у ґрунті. З місць зимівлі виходять при температурі повітря понад 6 °С. Масовий виліт розпочинається при температурі повітря близько 12 °С. Заселення починається з країв і поступово поширюється на всю площу. Відчуваючи загрозу, жук спадає із рослини ріпаку, завмирає, тому його важко знайти на посівах. Розвивається жук в одному поколінні.

Згідно ст. 5, 6 Закону України «Про захист рослин», спеціалістам господарств усіх форм власності необхідно проводити систематичні обстеження посівів та своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту рослин. Тому по мірі заселення посівів шкідником і досягнення порогу шкодочинності (1-2 жуки на 40 рослин або 4-6 жуків на одну жовту посудину на краю поля за 3 доби) — необхідно провести крайові або суцільні обробки посівів одним із препаратів згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Обприскують за середньодобової температури вище 6 °С, важливо це зробити до початку яйцекладки. В умовах холодної і довгої весни обприскати посіви повторно.



УВ
Головне управління Держпродспоживслужби у
Волинській області
№03-14/1813 від 10.03.2025
КЕП: Коваль В. С. 10.03.2025 12:38
3FAA9288358EC003040000009A8138003F11CF00
Сертифікат дійсний з 31.01.2024 00:00 до 30.01.2026 23:59

Крім того, при підвищенні температури відбуватиметься перезараження рослин запасом минулорічної інфекції альтернаріозу, фомозу, пероноспорозу, тому рекомендуємо разом з інсектицидами в бакові суміші додавати фунгіциди дозволені «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні»

При роботі з пестицидами необхідно суворо дотримуватись регламентів застосування препаратів, правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

Начальник

Володимир КОВАЛЬ

Наталія Горпинюк
(0332) 280 682

